

Dvojný integrál

Cvičení 10

S A M O S T U D I U M

teorie: skripta J. NEUSTUPA, Matematika II, vydání r. 2016, str. 50-57

Příklady v elektronické sbírce jsou uvedeny níže.

Dvojný integrál v KARTÉZSKÝCH souřadnicích

$\iint_D f(x, y) \, dx dy$ Integrál počítáme převedením na dvojnásobný – dvojnásobnou integraci funkce jedné proměnné.

Oblast D je **OBDÉLNÍK** (strany rovnoběžné s osami)

$$a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d , \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

POUZE v tomto případě nezáleží na pořadí výpočtu.

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy$$

Příklady

① $\iint_D (x + 3) \, dx dy \quad D = \{[x, y] : x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 2 \rangle\}$

② $\iint_D xye^{xy^2} \, dx dy \quad D = \{[x, y] : x \in \langle 0, \ln 2 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle\}$

Příklady

- ① $\iint_D \frac{y}{\sqrt{(1+x^2+y^2)^3}} \, dx dy,$
 $D = \{[x, y] : x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 1 \rangle\}$
- ② $\iint_D x^2 y e^{xy} \, dx dy \quad D = \{[x, y] : x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 2 \rangle\}$
- ③ $\iint_D x^2 y \cos(xy^2) \, dx dy, \quad D = \{[x, y] : x \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle, y \in \langle 0, 2 \rangle\}$

Oblast D je OBDÉLNÍK a $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$

POUZE v tomto případě lze počítat:

$$\iint_D f_1(x) \cdot f_2(y) \, dx dy = \int_a^b f_1(x) \, dx \cdot \int_c^d f_2(y) \, dy$$

Příklady

① $\int_0^2 \int_0^1 (x + 3) \, dx dy = \int_0^2 dy \cdot \int_0^1 (x + 3) \, dx$

② $\iint_D e^{2x+3y} \, dx dy, \quad D = \{[x, y] : x \in \langle 0, 1 \rangle, y \in \langle 0, 2 \rangle\}$

③ $\iint_D x^2 y \, dx dy, \quad D = \{[x, y] : x \in \langle 0, 2 \rangle, y \in \langle 1, 2 \rangle\}$

Obecná rovinná oblast. Elementární obor integrace v \mathbb{E}_2

(skripta, str.56)

Nechť funkce $y = g_1(x)$ a $y = g_2(x)$ jsou spojité na intervalu $\langle a, b \rangle$ a $g_1(x) \leq g_2(x)$ pro všechna $x \in \langle a, b \rangle$. Pak množinu



$M = \{[x, y] \in \mathbb{E}_2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ nazýváme

elementárním oborem integrace
vzhledem k ose x.

Nechť funkce $x = h_1(y)$ a $x = h_2(y)$ jsou spojité na intervalu $\langle c, d \rangle$ a $h_1(y) \leq h_2(y)$ pro všechna $y \in \langle c, d \rangle$. Pak množinu

$M = \{[x, y] \in \mathbb{E}_2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ nazýváme

elementárním oborem integrace
vzhledem k ose y.



Fubiniho věta: skripta, str. 57

Nechť M je elementární obor integrace vzhledem k ose x . (EOI_x)

Nechť funkce $f(x, y)$ je spojitá v M . Potom platí:

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \right) \, dx$$

Nechť M je elementární obor integrace vzhledem k ose y . (EOI_y)

Nechť funkce $f(x, y)$ je spojitá v M . Potom platí:

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \right) \, dy$$

Oblast D je nutné zapsat jako EOI vzhledem k ose x nebo k ose y .

Teprve potom lze dvojný integrál převést na dvojnásobný.

Vnější meze musí být konstantní!

Nejdříve určíme vnitřní integrál, potom vnější.

Příklady

Určit meze integrace $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

- ① D je trojúhelník ABC : $A = [0, 0]$, $B = [a, 0]$, $C = [0, a]$
- ② D je trojúhelník ohraničený: $y = 1$, $y = x + 4$, $y = 6 - x$
- ③ D je čtyřúhelník
 $A = [0, 0]$, $B = [1, 2]$, $C = [3, 1]$, $D = [2, -2]$
- ④ D je ohraničena křivkami: $y = x^2$, $y^2 = x$

Záměna pořadí integrace.

Přechod od zápisu dvojnásobného integrálu ve tvaru

$$\int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx \text{ do tvaru } \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

Příklady

- ① $\int_0^1 \int_0^2 f(x, y) \, dy \, dx + \int_1^3 \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x, y) \, dy \, dx$
- ② $\int_0^2 \int_1^{e^y} f(x, y) \, dx \, dy$

Příklady

https://mat.nipax.cz/_media/dvojny_integral.pdf

261 – 276